

CREMA AMINOACIDICA NEL TRATTAMENTO DELLA RAGADE ANALE

F Spinelli, I Spinelli. UCP Clinica Villa Giose, Crotone

Introduzione: scopo di questo studio è quello di valutare gli effetti dell'utilizzo di crema a base di aminoacidi sulla riepitelializzazione della giunzione anodermo-mucosa della ragade anale attraverso la stimolazione dei fibroblasti che concorrono alla produzione di collagene attraverso l'apporto di ossido di azoto (NO).

Pazienti e metodi: lo studio è stato condotto su 42 pazienti di cui sono state esaminate le caratteristiche della ragade con l'esecuzione di esame proctologico con anosopia e manometria anorettale. Sono stati applicati 2ml di crema aminoacidica ogni 12 ore. *Risultati:* Dei 42 pazienti trattati, in 28 (67%) si è osservata la completa cicatrizzazione della ragade, 11 (26%) sono stati sottoposti successivamente a sfinterotomia laterale, 2 (4,7) pazienti non si sono presentati al follow-up.

Conclusioni: lo studio evidenzia come in un'alta percentuale di casi l'utilizzo della crema aminoacidica ha stimolato la riparazione tissutale della ragade. Si è osservata inoltre una significativa riduzione della sintomatologia dolorosa già dopo una settimana di utilizzo della crema. Tali risultati preliminari indicano che l'applicazione costante di crema a base di aminoacidi può rappresentare una efficace alternativa alla chirurgia